

عصاره

تاناستوم Tanacetum ZB



گیاه تاناستوم یا بابونه گاو چشم از دیرباز به عنوان یک گیاه دارویی ارزشمند مطرح بوده است. امروزه از این گیاه در پیشگیری و بهبود حملات حاد میگرنی، آرتريت روماتوئید، التهاب، اسپاسم، آمنوره و تینیتوس (وزوز گوش) استفاده می گردد.

این عصاره از سرشاخه گلدار گیاه تاناستوم تهیه شده است. بذر این گیاه توسط زنده یاد دکتر رضا امیدبیگی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت دارویی زردبند اصلاح شده و به نام رقم زردبند (cv. Zardband) به ثبت رسیده است. عصاره تهیه شده از این گیاه نسبت به ارقام دیگر، حاوی مقدار پارتنولید بیشتری می باشد.

مورد مصرف

• کمک به بهبود میگرن

ماده مؤثر

• پارتنولید

مکانیسم اثر

مانعت از اتصال سروتونین به گیرنده اش

• گیرنده های سروتونین نقش مهمی در فیزیوپاتولوژی میگرن دارند. پارتنولید موجود در این گیاه آنتاگونیست نسبی گیرنده های سروتونین بوده، از اتصال سروتونین به گیرنده هایش جلوگیری می کند و اثر ضد میگرنی خود را اعمال می نماید.

تأثیرات ضد التهابی

• پارتنولید بیان ژن سیکلوآکسیژناز و سیتوکاین های پیش التهابی مانند TNF- α را مهار می نماید. سزکویی ترین لاکتون های موجود در این عصاره از تولید پروستاگلندین ها جلوگیری کرده و از این رو موجب کاهش التهاب می گردند.

تأثیر بر پلاکت ها

• سزکویی ترپن های موجود در عصاره تاناستوم به ویژه پارتنولید با خنثی کردن گروه های سولفیدریل در درون یا بیرون سلول ترشح سروتونین از پلاکت ها را مهار و با جلوگیری از تجمع پلاکت ها به پیشگیری از میگرن کمک می نماید.

تأثیر بر میکروگلیاها

• تأثیر التهاب بر فعال سازی میکروگلیاها به عنوان یکی از دلایل بالقوه در حملات میگرنی مورد توجه می باشد. پارتنولید با کاهش فعال سازی میکروگلیاها به واسطه تأثیر بر واسطه های پیش التهابی مرتبط با حملات میگرنی به بهبود این بیماری کمک می نماید.

مقدار و نحوه مصرف

• روزانه ۳ تا ۴ مرتبه و هر بار ۱۰ الی ۱۵ قطره را در مقداری آب یا آب میوه ریخته و بلافاصله میل شود.

دوره مصرف

مصرف این عصاره صرفاً برای زمان سردرد نبوده و مبیایست طی یک دوره سه ماهه (صرف نظر از اینکه فرد دچار سردردهای میگرنی می شود یا خیر) بصورت مداوم و منظم مصرف شود تا اثر مطلوب حاصل گردد. در صورتی که پس از دوره سه ماهه، تعداد دفعات و شدت بروز سردردهای میگرنی کاهش یابد می توان مصرف عصاره را به هفته ای دو بار تقلیل داد.

موارد احتیاط و منع مصرف

- از مصرف این فرآورده در زمان بارداری و شیردهی خودداری شود.
- از مصرف همزمان این فرآورده با داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID) خودداری شود.
- با توجه به اینکه تاناستوم از تجمع پلاکت ها جلوگیری می کند از اینرو می بایست در استفاده همزمان این فرآورده با سایر داروهای ضد تجمع پلاکتی (آنتی کواگولانت) مانند آسپیرین و دی پریدامول جانب احتیاط رعایت شود.
- چنانچه قصد تولد فرزند و یا ایجاد ولقه در آن را دارید، دوز مصرفی را به تدریج کاهش دهید.
- افرادی با سابقه حساسیت به گیاهان خانواده کاسنی از مصرف این فرآورده اجتناب نمایند.
- اثرات این فرآورده ۴ تا ۸ هفته بعد از شروع مصرف ظاهر می شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

کمک به بهبود میگرن

نکات قابل توجه

این فرآورده عصاره طبیعی و خالص گیاه تاناستوم است و به منظور حفظ خواص کامل آن و رعایت سلامت مصرف کننده در این فرآورده از هیچ ماده افزودنی و طعم دهنده (از قبیل شکر) استفاده نشده است. از این رو در صورتیکه خوردن آن برای شما مشکل باشد، می توانید آن را همراه با نوشیدنی میل نمایید. به منظور پوشاندن طعم و مزه تلخ آن می توانید تعداد قطرات توصیه شده را به صورت مستقیم بر روی یک حبه قند چکانده و مصرف نمایید.

شرایط نگهداری

- مجاورت این عصاره با هوا از کیفیت آن می کاهد، لذا توصیه می شود بلافاصله پس از مصرف در ظرف بسته شود.
- از یخ زدگی ممانعت شود.
- در جای خشک و تاریک و در دمای محیط (کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد) نگهداری شود.

تولید عصاره تاناستوم با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته و دارای پروانه ثبت فرآورده مکمل به شماره ۷۰۰۶۹۰۰۶۸۱۰۰۰۸ و استاندارد کارخانه ای ۶۵/۸۱/۰۰۰۰۲ می باشد.

مصرف کننده گرامی ایمیل info@zardband.com آماده پذیرش هر گونه پیشنهاد و انتقاد شما می باشد. لطفاً با ما در تماس باشید www.zardband.com تلفن دفتر تهران: ۰۲۱-۸۸۶۱۸۴۲۱-۴

